

analgesia e traumi



BRUFEN ANALGESICO 400 mg
12 compresse rivestite



DICLOREAM UNIDIE
5 cerotti medicati



VOLTAREN EMULGEL 2%
tubo da 180 g

influenza e apparato respiratorio



NEO BOROCILLINA PROPOLMIELE
Pastiglie
Spray



REVIS FORTE
Integratore difese immunitarie, 12 bustine



IMMUNOMIX ADVANCE
Sciropo
Capsule



Settembre/ottobre 2024

EXPERTA

La farmacia che ti ascolta



Posso aiutarti?

Scopri i nostri consigli per te

www.farmaciaexperta.it

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE E IL RISCHIO ICTUS

La Fibrillazione Atriale è responsabile del 20% dei casi di ICTUS¹ ed è quindi uno dei principali fattori di rischio.

La Fibrillazione Atriale è un'irregolarità del battito del cuore legata alla contrazione irregolare delle camere superiori (atri) che determina un ristagno di sangue che può portare alla formazione di coaguli. Se i coaguli si immettono nella circolazione sanguigna e arrivano al cervello possono causare un ICTUS ischemico.

L'ICTUS è un danno cerebrale conseguente all'interruzione dell'afflusso di sangue al cervello, perché un'arteria si occlude o si rompe. Il cervello perde l'apporto di energia e di ossigeno subendo danni che possono portare a disabilità o, peggio, alla morte.

I NUMERI DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE E DELL'ICTUS

La Fibrillazione Atriale è tra le anomalie del ritmo cardiaco più comuni nella popolazione adulta. In Italia colpisce circa 1.000.000 di persone², con più di 120.000 nuovi casi ogni anno. I dati si riferiscono solo ai casi accertati, ma quelli totali sono ben più numerosi perché la Fibrillazione Atriale spesso resta asintomatica o con sintomi che possono essere confusi con altre patologie, come un senso di battito cardiaco irregolare o veloce, difficoltà nel respirare sotto sforzo (dispnea) e facile affaticamento (astenia).

In Italia circa 200.000 persone ogni anno³ vengono colpite da ICTUS, che è:

- la prima causa di invalidità;
- la seconda causa di demenza;
- la terza causa di morte.

Purtroppo, questi numeri sono peggiorati durante la pandemia da COVID-19 con un incremento della mortalità per Fibrillazione Atriale del 24,2%⁴.

Questo dato si spiega con una riduzione dei pazienti diagnosticati con Fibrillazione Atriale (-47%) perché, non andando dal medico, non venivano identificati e curati.

¹European Heart Rhythm Association; European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, Schotten U, Savelieva I, Emsl S, Van Gelder IC, Al'Attar N, Hindricks G, Prendergast B, Heidbuchel H, Alfieri O, Angelini A, Alar D, Colonna P, De Caterina R, De Sutter J, Goette A, Gorenek B, Haldal M, Hohloser SH, Kolh P, Le Heuzey JY, Ponikwskl P, Rutten FH. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010 Oct; 31(19):2369-429. Erratum in: Eur Heart J. 2011 May;32(9):1172.

²Zoni-Berisso M, Filippi A, Landolina M, Brignoli O, D'Ambrosia G, Maglia G, Grimaldi M, Ennini G. Frequency, patient characteristics, treatment strategies, and resource usage of atrial fibrillation (from the Italian Survey of Atrial Fibrillation Management [ISAF] study). Am J Cardiol. 2013 Mar 1;111(5):705-11.

³<https://www.aliceitalia.org/approfondimenti/cosa-%C3%A8-ictus/>

⁴Istituto Superiore di Sanità. Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia <https://www.>

È POSSIBILE PREVENIRE 3 ICTUS SU 4 CAUSATI DA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Le persone che soffrono di Fibrillazione Atriale hanno un rischio di ICTUS da 3 a 5 volte superiore rispetto ai pazienti che non ne soffrono. La Fibrillazione Atriale è difficile da diagnosticare perché è spesso resta asintomatica o parossistica (va e viene).

Molto importante diventa un approccio proattivo di pazienti, medici e farmacisti che permetta di generare il sospetto di Fibrillazione Atriale nei soggetti a rischio (over 65, sovrappeso, con problemi di ipertensione, diabete, apnee notturne, etc...).

Basta un controllo del battito cardiaco attraverso la palpazione del polso o una misurazione della pressione con apparecchi automatici dotati di algoritmo validato per la rilevazione di una possibile Fibrillazione Atriale.

Una volta individuato il sospetto di Fibrillazione Atriale va comunicato con tempestività al proprio Medico che effettuerà gli accertamenti necessari per arrivare alla diagnosi e alla cura.

cuore



MICROLIFE
AFIB ADVANCE EASY
Misuratore di pressione elettronico

energia e umore



BETOTAL B-FASE
20 compresse doppio stato

stomaco e intestino



ENTEROLACTIS
Bevibile
12 flaconi da 10 ml

cura bocca



PARADONTAX
Classico
Menta fresca